



SZENT LÁSZLÓ  
KÓRHÁZ

SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ  
Cím: 9600 Sárvár, Rákóczi u. 30. Tel: 95/320-011, 95/523-000 Fax: 95/320-010  
E-mail: korhaz@korhazsarvar.hu • www.korhazsarvar.hu

## Egynapos Sebészet

Osztályvezető főorvos: **Dr. Drácz Lajos**  
Tel.: 06-95/523-006, Fax: 06-95/523-010

NEAK KÓD: 1803E0201

## Tudnivalók és utasítások ambuláns/egynapos beavatkozások esetén

### Tisztelt Betegünk!

Szíveskedjék az alábbi tájékoztató elolvasni!

A tervezett műtétet megelőzően Ön először az aneszteziológiai ambulancia előkészítő munkája során, majd közvetlenül a műtét napján találkozik Műtési Egységünk altató orvosával. A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtėti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel végezzük. Az érzéstelenítésre, a beavatkozás idejében a légzés, a vérkeringés és egyéb szervek működésének fenntartására az érzéstelenítést végző aneszteziológus orvos illetékes. Munkája a beavatkozást végző, operáló orvossal együttműködve az Ön biztonságát szolgálja.

### Az érzéstelenítés különböző módszerekkel történhet:

#### 1, Altatás (általános érzéstelenítés), / i.v.narc.

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul. Az alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig tartunk fenn.

A műtétet megelőzően már a kórteremben vagy az előkészítőben tablettát, vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. A műtétben a kéz vénájába infúziót vezetünk be, majd az érzéstelenítést általában azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük, vagy altatógázokat adunk arcmaszk, gégemaszk, illetve a légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigén és altatógázok keverékét.

Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt, korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek az Ön alapvető élettani működésének fenntartásában.

#### 2, Regionális/ IVRA/ helyi érzéstelenítés

A fájdalommentesség a test operálandó/műtendő területére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem párosul.

A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza. Gerincközeli (spinális vagy epidurális) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és az alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé vagy köré. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes

A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg a műtét alatt nem érzi és nem képes mozgatni a beteg.

Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai, ezért mindig a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából legmegfelelőbbet javasoljuk.

### **Az érzéstelenítő eljárások veszélyei:**

Sajnos, minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még rossz általános állapotú betegeknél is ritkák. Az általános érzéstelenítés (altatás), amely korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk.

### **Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:**

#### *1, Nagyon gyakori:*

- a, Száraz torok
- b, Átmeneti zavartság, tájékozatlanság
- c, Hányinger, hányás
- d, Fejfájás, hátfájás

#### *2, Gyakori:*

- a, Vénagyulladás
- b, Erős fájdalom a műtétet követően
- c, Átmeneti látászavar
- d, Szájsérülés
- e, Verőér véletlen szúrása központi véna biztosításakor
- f, Nehéz légút biztosítás
- g, Remegés, hidegrázás

#### *3, Kevésbé gyakori:*

- a, Fogsérülés
- b, Gégegörcs
- c, Gépek meghibásodása
- d, Véletlen ébrenlét
- e, Légút biztosítás kivitelezhetetlensége

#### *4, Ritka:*

- a, Gyógyszerallergia
- b, Szívmegállás
- c, Halálozás

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG stb.) folyamatosan ellenőrizzük.

### **A regionális, helyi érzéstelenítés mellékhatásai:**

A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az esetlegesen előforduló idegsérülések ritkák.

#### *1, Gyakori:*

- a, Fejfájás
- b, Átmeneti vizeletelési zavar

#### *2, Kevésbé gyakori:*

- a, Derékfájás
- b, Tályog epidurális kanülálást követően
- c, Központi idegrendszer görcsei

#### *3, Nagyon ritka:*

- a, Alsó testfél bénulás
- b, Gerinchártya bevérvzése
- c, Szívmegállás
- d, Halálozás



Azokat a problémákat, amelyek Önnél nagyobb eséllyel fordulhatnak elő, az altató orvos mondja el részletesen az első találkozásuk alkalmával.

**Kérjük, hogy műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket:**

- 1, A műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon! A pontos időpontot altató orvosa határozza meg.
  - a, Műtét előtti napon éjfélig még ihat folyadékot, a műtét reggelén csak annyi folyadékot, amivel a reggeli gyógyszereit, amit az anaeszteziológus szakorvos javasolt.
  - b, Műtét előtti este 18 órakor még ehet könnyen emészthető ételt
- 2, Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el!
- 3, Ékszereit vegye le, mossa le a körömlakkot, szemfestéket!
- 4, Testékszereit (piercing) távolítsa el!
- 5, Kérdezzen!

A műtétet követően:

- 1, A műtétet követően az Ön elbocsátásának számos feltétele van.
- 2, Csak akkor bocsátjuk el, ha:
  - a, nincs sebészeti probléma
  - b, az Ön tudata, ítélőképessége tiszta,
  - c, önállóan képes járni,
  - d, tud önállóan inni, vizeletet üríteni,
  - e, nincs hányingere,
  - f, fájdalom egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól csillapítható,
- 3, Az érzéstelenítést követően csak kísérelővel (!), hozzátartozó kíséretében térhet haza.
- 4, Szükség esetén gondoskodni kell az Ön otthoni ellátásáról, ápolásáról.
- 5, Az altatás utóhatása miatt leghamarabb csak 24 óra elteltével vehet részt aktívan az utcai forgalomban, dolgozhat gépen, vezethet járművet, fogyaszthat alkoholt, tanácsos szerződést, megállapodást kötnie.
- 6, Ételt, italt mértéktartóan fogyasszon a műtét napján.
- 7, Fájdalomcsillapításra a szokványos gyógyszerei alkalmasak, hacsak az altató orvos egyéb készítményt nem ajánl.

**Az érzéstelenítést követően betartandó, csak Önre vonatkozó szabályok:**

.....  
.....  
.....

Panasz, szövődmény esetén az alábbi telefonszámon folyamatosan kap tanácsot, segítséget:

Telefonszám:.....

Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti találkozáskor!

**Igazolom, hogy a fenti tudnivalókat tudomásul vettem.**

Sárvár, 2020. szeptember 04.

.....  
a felvilágosítást végző  
aneszteziológus orvos aláírása

.....  
a beteg, illetve törvényes képviselője aláírása